

تالفاست® 180 ملغ

هيدروكلوريد الفيكسوفينادين

قرص ملطف بخشاره رقيق

Telfast® 180 mg

بالإضافة إلى ذلك، فإن طريقة انتشار هذا الدواء غير معروفة. يوصى به
المرضعات.

قيادة السيارات واستخدام الآلات

ليس لـتالفاست 180 ملغ قرص مختلف بخشاره رقيق أي تأثير سلبي على
استخدام الآلات.

مع ذلك، قبل قيامك بالقيادة أو بأداء مهام تتطلب التركيز الكامل، يجب
الدواء لا يؤدي عنده إلى تجاويف غير اعتيادي وتعديل في البصرة.

3. غير نشاط تالفاست 180 ملغ قرص مختلف بخشاره رقيق

المقدار
هذا الدواء مخصوص للاستعمال عند البالغ والطفل فوق 12 سنة من الع
المقدار قرص واحد يومياً.

كيفية الاستعمال وطريق الإعطاء
عن طريق الفم

مدة المعالجة
يجب الانتداب بوصفة الطبيب.

إذا كنت قد تناولت أكثر مما يجب من تالفاست 180 ملغ قرص مختلف
عليك بالاستشارة طبيب.

4. ما هي التأثيرات غير المرغوبية المحتملة

مثل كافة الأدوية، قد يسبب تالفاست 180 ملغ قرص مختلف بخشاره ر
المرغوبة، على الرغم من عدم ضرورة تعرض الجميع لذلك:

• أبلغ عن حالات قليلة الشibus من الصداع، وجفاف الفم، واصطربابات
وتشود بالدرببة والنفعان.

• نادراً ما تم الإبلاغ عن حالات تحسسية مثل عطف جلدي، وحكة وغيره
النظمية.

إذا لاحظت أي تأثيرات غير مرغوبة غير مذكورة في هذه النشرة أو ثباتها
المرغوبة، يرجى إبلاغ طبيبك أو الصيدلي.

5. كيد بخشاره تالفاست 180 ملغ قرص مختلف بخشاره رقيق

يحفظ بعيداً عن متناول أيدي الأطفال و المجال بصرهم.
يجب عدم استعمال تالفاست 180 ملغ قرص مختلف بخشاره رقيق بعد
الدورة على العيبة الخارجية.

يُحفظ بعيداً عن الأطبار وفي حرارة لا تتجاوز 30 درجة مئوية.
يجب عدم التخلص من الدواء عن طريق مياه الصرف الصحي أو النفايات
إصال الصيدلي عن كيفية التخلص من الأدوية التي لم تستعمل.
سوف تساعد هذه الإجراءات في حماية البيئة.

6. معلومات إضافية

على ماذا يحتوي تالفاست 180 ملغ قرص مختلف بخشاره رقيق؟
 المادة الفعالة هي:

هيدروكلوريد فيكسوفينادين 180 ملغ لكل آ

المكونات الأخرى هي:
سيلولوز ميكروبلوري، ثناء النتره المهيكل مسقاة، كروسكاربليوز الص
المغفنوسون، هايبروميلون، ماكروغول 400، ثاني أكسيد النيتانيوم، سـ
بوريفدين، أكسيد الحديد الأصفر، أكسيد الحديد الأحمر.

ما هو تالفاست 180 ملغ قرص مختلف بخشاره رقيق وما هو محمول
يتغور هذا الدواء على شكل قرص مختلف بخشاره رقيق. عليه تحتوي على
بخشاره رقيق. قد لا تكون جميع العبوات مسوقة في بلدك.

- الرجاء قراءة هذه الفحصة بعناية قبل تناول هذا الدواء.
- احتفظ بهذه النشرة فقد تحتاج إلى قرائتها مرة أخرى.
 - إذا كان لديك أي سائلة، أو أي شكل، اطلب مزيداً من المعلومات من طبيبك أو الصيدلي.
 - تم وصف هذا الدواء لك، لا تقدمه لأي شخص آخر حتى لو كان يعاني من نفس الأعراض التي تعاني منها.
 - في حال ظهور أي من التأثيرات غير المرغوبة، أو إذا لاحظت أي تأثير غير مرغوب فيه غير مذكور في هذه النشرة، يرجى إخبار طبيبك أو الصيدلي.

في هذه الفحصة:

1. ما هو تالفاست 180 ملغ قرص مختلف بخشاره رقيق وفيما يستعمل
2. ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل تناول تالفاست 180 ملغ قرص مختلف بخشاره رقيق
3. كيف تناول تالفاست 180 ملغ قرص مختلف بخشاره رقيق
4. ما هي التأثيرات غير المرغوبة المحتملة
5. كيف يحافظ تالفاست 180 ملغ قرص مختلف بخشاره رقيق
6. معلومات إضافية.

1. ما هو تالفاست 180 ملغ قرص مختلف بخشاره رقيق وفيما يستعمل

المجموعة الصيدلانية العلاجية

مضاد نؤامي للهيستامين

(R. الجهاز النفسي)

دواعي الاستعمال الملاجية

هذا الدواء هو مضاد للهيستامين H1.

بوصف معالجة الحكة المصاصحة للشري.

2. ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل تناول تالفاست 180 ملغ قرص مختلف بخشاره رقيق

موانئ الاستعمال

لا تتناول تالفاست 180 ملغ قرص مختلف بخشاره رقيق في الحالات التالية:

- طفل أقل من 12 عاماً لعدم توفر معلومات عن الفاعلية والسلامة.
- في حالة وجود سوابق تحسسية تجاه أي من مكونات هذا الدواء.

في حالة الثالث، فمن الضروري استشارة طبيبك أو الصيدلي.

احتياطات الاستعمال: تحذيرات خاتمة

كن حذراً عند استخدام تالفاست 180 ملغ قرص مختلف بخشاره رقيق

- إذا كنت شخصاً مسنًا.
- إذا كنت تعاني من عملة في الكبد أو الكلى.

أطلب مشورة طبيبك أو الصيدلي

تناول أو استخدام أدوية أخرى لتجنب التداخلات الدوائية المحتملة. يجب إبلاغ طبيبك بانتظام عن كل علاج آخر فيه

الاستعمال، وخاصة الأدوية التي تحتوي على الباربازون أو الستوككتازول.

إذا كنت تتناول بضمادات حموضة المعدة (هيدروكسيد الألومنيوم أو المغنتسيوم)،

ينبغي تناولها قبل أو بعد تناول هذا الدواء بساعتين على الأقل.

إذا كان لديك شك، لا تتردد في استشارة طبيبك أو الصيدلي.

الحمل والإرضاع

يفضل عدم استخدام هذا الدواء أثناء الحمل.

إذا اكتشفت أنك حامل أثناء المعالجة، عليك باستشارة طبيبك حيث أنه الوحيد الذي يمكنه تحديد مدى حاجتك للاستمرار في تناول الدواء.

الإرضاع

يشكل عاماً، في حالة الحمل والإرضاع، يجب دائمآ طلب مشورة طبيبك أو الصيدلي قبل تناولك أي دواء.

